

VIKTIG INFORMATION OCH UPPMANING

från Jordbruksverket angående fågelinfluensa!

Här följer rekommendationer till aktörer i fjäderfäbranschen under rådande läge med högpatogen fågelinfluensa. Dessa måste tas på största allvar!

• Vintern 2020–2021 har varit Sveriges hittills värsta säsong för högpatogen fågelinfluensa (HPAI). Smittriskerna är störst från vilda fåglar men efter utbrott i totalt fem fjäderfäanläggningar är smittspridning mellan besättningar med fjäderfä också en risk. Rådande läge kräver att alla aktörer i kedjan gör sin del för att stärka smittskyddet.

Hur sprids fågelinfluensavirus?

Virus utsöndras i fåglarnas utandningsluft och i fåglarnas spillning och kan spridas i direkt kontakt mellan fåglar. Men den sprids också indirekt genom att virus hamnar till exempel i foder, strömedel, på utrustning, stövlar eller kläder som sedan kommer i kontakt med fåglar eller i kontakt med något som fåglar sedan kommer i kontakt med. Gödsel, strömedel, vatten, fjäder och damm från smittade flockar kan innehålla mycket virus som kan överleva länge. Virus förekommer sannolikt i utomhusmiljön i stora delar av Sverige just nu så det är vik-

tigt att material utifrån inte följer med in i djurutrymmen, foderutrymmen, packrum och annat.

Personal och besökare

- Följ ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar och stärk dem vid behov.
- Gå inte in och ut ur djurutrymmet oftare än vad som är nödvändigt för djurens skötsel.
- Undvik besökare och tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
- Se till att alla som går in i fjäderfähus byter kläder, skor och strumpor samt tvättar och spritar händerna vid hygiengränsen.
- Ta av yterskor och byt till inneskor vid yttre hygiengräns som ska vara placerad vid inträde till förrum, packrum eller motsvarande. Rengör golvet regelbundet med rengöringsmedel och helst direkt om ytan kan ha blivit kontaminerad utifrån.
- Utbilda personalen i smittskydd.
- Upprätta skriftliga instruktioner och skyltar på aktuellt språk med gällande regler för personal och besökare.

- Ge de nödvändiga besökarna, som till exempel hantverkare, tydlig skriftlig och muntlig information om vilka smittskyddsrutiner som gäller på gården.
- Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du haft kontakt med fjäderfä i andra flockar.

Transporter och utrustning

- Sträva efter att ha egen utrustning till varje flock. Om det inte är möjligt, rengör och desinficera redskap och utrustning både före och efter användning i olika flockar.
- Tänk på att ytteremballage och liknande avlägsnas utanför stallbyggnaderna och att du tvättar och spritar händerna när du hanterat materialet. Lastpallar utifrån får inte komma in till rena utrymmen.
 - Separera rena körvägar för till exempel foder, ägg och djur från orena körvägar för till exempel gödsel och kadaver.
 - Använd en egen foderslang i stället för foderbilens om möjligt.
- Förvara din foderslang i slutet behållare.
- Informera foder-, ägg- och slakttransportörer med flera vid ökad dödlighet i flocken så att inbokade transporter kan stoppas och smittskyddsåtgärder vidtas

Vilda fåglar, skadedjur och husdjur

- Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren, foder eller strö via öppna dörrar, fönster eller ventilation.

- Kontrollera att till- och frånluftsdon är fågelsäkrade och kontrollera att vågrum och andra utrymmen utestänger vilda fåglar.
- Minimera foderspill, vattenansamlingar och annat som lockar vilda fåglar.
- Rengör och desinficera utrustning som förvarats utomhus innan den tas in i djurutrymmen.
- Håll allt grovfoder och strömedel täckt eller i stängda utrymme för att förhindra att fågelspillning följer med in i stallet.
- Håll rent runt hus och inhägnader.
- Bekämpa skadedjur kontinuerligt då de kan föra med sig virus in i byggnader.
- Husdjursförbud ska råda i alla byggnader kopplade till fjäderfäproduktionen.
- Installera fågelpiggar och fågelsträmmor som ljudkanoner, reflekterande remсор eller drakar vid behov.

Du ska vara uppmärksam på följande och alltid kontakta veterinär omgående om:

- Dödligheten ökar i din besättning. Erfarenheten från det pågående utbrottet är att man behöver agera även om det bara är en liten ökning i dödlighet.
- Förändringar i foder- och vattenkonsumtionen ska noteras.
- Produktionen av ägg minskar
- Äggskalen förändras
- Djuren får nedsatt allmäntillstånd. I ovanstående situation bör du också informera foder- och ägg- och slakttransportörer med flera så att inbokade transporter kan stoppas och/eller smittskyddsåtgärder kan vidtas.

Rekommendationer till transportörer

- Följ ordinarie hygienrutiner vid besök på gårdarna.
- Undvik om möjligt att gå in i byggnader på anläggningar.
- Om du behöver gå in, gör vad du kan för att förhindra att virus kommer in i lokalerna utifrån. Ta på skoskydd eller anläggningens skor vid hygiengränsen vid alla ingångar till packrum, förrum och liknande för att förhindra att golvet kontamineras. Om truck ska köras på golvet i packrum eller kylrum ska den om möjligt rengöras och desinficeras före och efter. Alternativt kan personalen skura golvet efter ert besök.
- Undvik spill vid foderleverans och informera djurägaren om det uppstår.
- Säkerställ att inga vilda fåglar kan konta-

minera foder i samband med lastning, transport och leverans.

- Hjälp djurägaren att upprätthålla rena och orena körvägar så att fodertransporten inte behöver korsa ytor på gården där det finns gödsel.
- Uppmana alla kunder att omedelbart höra av sig till er vid ökad dödlighet så att inbokade transporter kan stoppas eller att smittskyddsåtgärder kan vidtas.
- Följ Jordbruksverkets restriktioner och smittskyddsåtgärder vad gäller spärrförlarade anläggningar eller anläggningar i skydds- eller övervakningszoner.
- Rengör och desinficera fordonet regelbundet enligt ordinarie rutiner. Tänk på att rengöringen är det viktigaste och att desinfektionsmedel inte har någon effekt på smutsiga fordon.

Av Maria Nöremark & Malin Grant, SVA
Marika Gunnarsson, Svenska Ägg

Mer information om biosäkerhet och smittskydd:



<https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomaroch-smittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/viktigaforebyggande-atgarder/biosakerhet.4.313254e916b-f39c1737243b0.html>

www.sva.se/produktionsdjur/fjaderfa/smittskydd-for-fjaderfa/skydda-dina-fjaderfa-mot-fagelinfluensa/

Microsoft Word - Plan och riktlinjer Smittskyddsprogram Master 2018.doc (svenskfagel.se)

www.svenskaagg.se/attachments/92/1710.pdf

Om dina djur drabbas av fågelinfluensa

Fågelinfluensa är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen. Det innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till läsveterinären och Jordbruksverket.

Läs mer här: <https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomaroch-smittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/omdinadjurdrabbasavfagelinfluensa.4.1aa561c816bfb30f4fdb8d6b.html>